

Guía para hablar con tu médico.

JULUCA es un medicamento de venta con receta que se usa sin otros medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1) en adultos a fin de reemplazar sus actuales medicamentos contra el VIH 1, cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos. El VIH 1 es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Se desconoce si JULUCA es seguro y eficaz en niños.

Usa la siguiente guía para evaluar tu tratamiento actual con tu médico y ver si JULUCA podría ser el próximo paso para ti.

1. El medicamento que estoy tomando actualmente es:

2. El tratamiento que tomo para el VIH es:

- 1 pastilla al día
 2 pastillas al día
 Más de 2 pastillas al día

3. Algunas pastillas tienen más de un medicamento. ¿Cuántos medicamentos tiene mi tratamiento actual para el VIH?

- 2 medicamentos
 3 medicamentos
 4 medicamentos
 Más de 4 medicamentos

4. Tengo efectos secundarios:

- Nunca Algunas veces A menudo

5. ¿Existen posibles efectos secundarios en mi cuerpo, producidos por mi medicamento para el VIH, por los que debería preocuparme?

Preguntas sobre JULUCA:

1. Ahora que soy indetectable*, ¿hay alguna razón para considerar cambiar a JULUCA?

2. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de tomar JULUCA?

3. ¿Cómo podría JULUCA adaptarse a mis objetivos de salud?

*Indetectable durante al menos seis meses. Indetectable significa mantener el VIH 1 en la sangre a niveles muy bajos (menos de 50 copias por mL).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome JULUCA si usted:

- Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a algún medicamento que contenga dolutegravir o rilpivirina.
- Toma cualquiera de los siguientes medicamentos:
 - dofetilida
 - carbamazepina
 - oxcarbazepina
 - fenobarbital
 - fenitoína
 - rifampicina
 - rifapentina
 - inhibidores de la bomba de protones (incluidos esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol)
 - hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)
 - más de una dosis de dexametasona (medicamento esteroide) o fosfato sódico de dexametasona

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de JULUCA en la página 2. Consulta los [Datos Importantes](#) sobre JULUCA en la página 4.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de JULUCA?

JULUCA puede provocar efectos secundarios graves, por ejemplo:

- **Erupción cutánea y reacciones alérgicas graves.** Llame de inmediato a su proveedor de salud si presenta una erupción cutánea al tomar JULUCA. **Deje de tomar JULUCA y busque atención médica de inmediato si presenta una erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos o síntomas:**
 - fiebre
 - sensación de enfermedad generalizada
 - cansancio
 - dolores musculares o articulares
 - ampollas o úlceras en la boca
 - ampollas o exfoliación de la piel
 - enrojecimiento o hinchazón de los ojos
 - hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
 - problemas para respirar
- **Problemas de hígado.** Las personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o C que tienen determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo más alto de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con JULUCA. También se han producido problemas de hígado, incluida insuficiencia hepática, en personas sin antecedentes de enfermedades de hígado u otros factores de riesgo. Su proveedor de salud puede hacerle análisis de sangre para comprobar el funcionamiento del hígado. **Llame inmediatamente a su proveedor de salud si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas de problemas hepáticos:**
 - color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia)
 - orina oscura, similar al color del té
 - deposiciones (heces) de color claro
 - náuseas o vómitos
 - pérdida del apetito
 - dolor, molestia o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Informe inmediatamente a su proveedor de salud o busque atención médica si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:**
 - tristeza o desesperanza
 - ansiedad o inquietud
 - piensa en hacerse daño (suicidarse)
 - ha tratado de hacerse daño
- **Los efectos secundarios más frecuentes de JULUCA incluyen los siguientes:**
 - diarrea
 - dolores de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JULUCA. Para obtener más información, consulte a su proveedor de salud o farmacéutico. Comuníquese con su proveedor de salud inmediatamente si presenta nuevos síntomas mientras toma JULUCA.

Antes de tomar JULUCA, informe a su proveedor de salud si:

- Alguna vez ha tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica grave a medicamentos que contengan dolutegravir o rilpivirina.
- Tiene o ha tenido problemas de hígado, incluso infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez ha tenido un problema de salud mental.
- Está embarazada o tiene pensado quedar embarazada. Uno de los medicamentos de JULUCA, llamado dolutegravir, puede ser perjudicial para su bebé en gestación.
 - Su proveedor de salud puede recetarle un medicamento diferente a JULUCA si está planeando quedar embarazada, o si el embarazo es confirmado en las primeras 12 semanas de embarazo.
 - Si puede quedar embarazada, el proveedor de salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con JULUCA, y deberá utilizar métodos efectivos de control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con JULUCA.
 - Informe a su proveedor de salud de inmediato si planea quedar embarazada, si queda embarazada o si piensa que puede estar embarazada durante el tratamiento con JULUCA.
- Está amamantando o planea hacerlo. **No amamante si está tomando JULUCA.** No debe amamantar si tiene VIH 1, ya que corre el riesgo de contagiarle el VIH 1 a su bebé. Se desconoce si JULUCA puede pasar al bebé a través de la leche materna.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Informe a su proveedor de salud sobre todos los medicamentos que utiliza, incluso aquellos recetados o de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales.

Algunos medicamentos interactúan con JULUCA. Mantenga una lista de sus medicamentos y muéstrsela a su proveedor de salud y a su farmacéutico cuando compre un nuevo medicamento.

- Puede consultar con su proveedor de salud o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con JULUCA.
- No comience a utilizar medicamentos nuevos sin informarle a su proveedor de salud. Su proveedor de salud puede decirle si es seguro tomar JULUCA con otros medicamentos.

¿Cómo tomar JULUCA?

- **Tome JULUCA una vez al día, exactamente como lo indique su proveedor de salud.**
- **Siempre tome JULUCA junto con una comida.** Una bebida proteica sola no reemplaza una comida.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Lea los [Datos Importantes](#) sobre JULUCA en la página 4 y coméntelos con su proveedor de salud.

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.



Para obtener información sobre acceso y cobertura y ayúdate con sus medicamentos recetados de ViiV Healthcare.
Asegurados • Seguro Insuficiente • No Asegurados

APRENDE MÁS



1-844-588-3288 (línea gratuita)
Lunes-Viernes, 8AM-11PM (ET)



www.viivconnect.com/es

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de JULUCA en la página 1. Consulta los [Datos Importantes](#) sobre JULUCA en la página 4.

 **Juluca**
dolutegravir 50 mg/
rilpivirine 25 mg tablets

©2019 ViiV Healthcare or licensor.
DBRBROC190004_SPAN November 2019
Produced in USA.



DATOS IMPORTANTES

Este es solo un resumen de la información importante sobre JULUCA y no reemplaza la conversación con su proveedor de salud sobre su afección y su tratamiento.

ya-lu-ca

ACERCA DE JULUCA

- JULUCA es un medicamento de venta con receta que se usa sin otros medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1) en adultos a fin de reemplazar sus actuales medicamentos contra el VIH 1, cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.
- El VIH 1 es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
- Se desconoce si JULUCA es seguro y eficaz en niños.

CÓMO TOMAR JULUCA

- Tome JULUCA una vez al día, exactamente como lo indique su proveedor de salud.
- Siempre tome JULUCA junto con una comida. Una bebida proteica sola no reemplaza una comida.

NO TOME JULUCA SI USTED:

- Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a algún medicamento que contenga dolutegravir o rilpivirina.
- Toma cualquiera de los siguientes medicamentos: dofetilida; carbamazepina; oxcarbazepina; fenobarbital; fenitoína; rifampicina; rifapentina; inhibidores de la bomba de protones (incluidos esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol sódico, rabeprazol); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*); o más de una dosis de dexametasona (medicamento esteroide) o fosfato sódico de dexametasona.

ANTES DE TOMAR JULUCA

Informe a su proveedor de salud si usted:

- Alguna vez ha tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica grave a medicamentos que contengan dolutegravir o rilpivirina.
- Tiene o ha tenido problemas de hígado, incluso infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez ha tenido un problema de salud mental.
- Está embarazada o tiene pensado quedar embarazada. Uno de los medicamentos de JULUCA, llamado dolutegravir, puede ser perjudicial para su bebé en gestación.
 - Su proveedor de salud puede recetarle un medicamento diferente a JULUCA si está planeando quedar embarazada, o si el embarazo es confirmado en las primeras 12 semanas de embarazo.
 - Si puede quedar embarazada, el proveedor de salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con JULUCA, y deberá utilizar métodos efectivos de control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con JULUCA.
 - Informe a su proveedor de salud de inmediato si planea quedar embarazada, si queda embarazada o si piensa que puede estar embarazada durante el tratamiento con JULUCA.
- Está amamantando o planea hacerlo. **No amamante si está tomando JULUCA.** No debe amamantar si tiene VIH 1, ya que corre el riesgo de contagiarle el VIH 1 a su bebé. Se desconoce si JULUCA puede pasar al bebé a través de la leche materna. Hable con su proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé.

ANTES DE TOMAR JULUCA (continuación)

Informe a su proveedor de salud todos los medicamentos que utiliza:

- Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos recetados y de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales, y muéstrasela a su proveedor de salud y a su farmacéutico.
- Consulte a su proveedor de salud o farmacéutico sobre los medicamentos que no deberían utilizarse junto con JULUCA.
- No comience a utilizar medicamentos nuevos sin informarle a su proveedor de salud.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE JULUCA

JULUCA puede provocar efectos secundarios graves, por ejemplo:

- **Erupción cutánea y reacciones alérgicas graves.** Llame de inmediato a su proveedor de salud si presenta una erupción cutánea al tomar JULUCA. **Deje de tomar JULUCA y busque atención médica de inmediato si presenta una erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos o síntomas:** fiebre; sensación de enfermedad generalizada; cansancio; dolores musculares o articulares; ampollas o ulceraciones bucales; ampollas o exfoliación de la piel; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua; problemas para respirar.
- **Problemas de hígado.** Las personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o C que tienen determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo más alto de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con JULUCA. También se han producido problemas de hígado, incluida insuficiencia hepática, en personas sin antecedentes de enfermedades de hígado u otros factores de riesgo. Su proveedor de salud puede hacerle análisis de sangre para comprobar el funcionamiento del hígado. **Llame inmediatamente a su proveedor de salud si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas de problemas hepáticos:** la piel o la parte blanca de los ojos se tornan de color amarillo (ictericia); la orina tiene un color oscuro, similar al color del té; las deposiciones (heces) tienen un color claro; náuseas o vómitos; pérdida de apetito; dolor, molestia o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago.
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Informe inmediatamente a su proveedor de salud o busque atención médica si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:** sensación de tristeza o desesperanza; sensación de ansiedad o inquietud; piensa en hacerse daño (suicidarse) o ha tratado de hacerse daño.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de JULUCA incluyen los siguientes:** diarrea y dolor de cabeza.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JULUCA. Comuníquese con su proveedor de salud inmediatamente si presenta nuevos síntomas mientras toma JULUCA. Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre JULUCA. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico para obtener más información.
- Visite JULUCA.com o llame al 1-877-844-8872, donde también puede obtener la información de instrucciones de uso del producto aprobada por la FDA.



Viiv Healthcare
Research Triangle Park, NC 27709

Trademarks are owned by or licensed to the Viiv Healthcare group of companies.

©2019 Viiv Healthcare or licensor.

October 2019 JLC:4PIL

IMPORTANT FACTS

This is only a brief summary of important information about JULUCA and does not replace talking to your healthcare provider about your condition and treatment.

(Jah-LOO-kah)

ABOUT JULUCA

- JULUCA is a prescription medicine that is used without other antiretroviral medicines to treat Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) infection in adults to replace their current anti-HIV-1 medicines when their healthcare provider determines that they meet certain requirements.
- HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
- It is not known if JULUCA is safe and effective in children.

HOW TO TAKE JULUCA

- **Take JULUCA 1 time a day exactly as your healthcare provider tells you.**
- **Always take JULUCA with a meal.** A protein drink alone does not replace a meal.

DO NOT TAKE JULUCA IF YOU

- have ever had an allergic reaction to a medicine that contains dolutegravir or rilpivirine.
- are taking any of the following medicines: dofetilide; carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; rifapentine; proton pump inhibitors (including esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole sodium, rabeprazole); St. John's wort (*Hypericum perforatum*); or more than 1 dose of the steroid medicine dexamethasone or dexamethasone sodium phosphate.

BEFORE TAKING JULUCA

Tell your healthcare provider if you:

- have ever had a severe skin rash or an allergic reaction to medicines that contain dolutegravir or rilpivirine.
- have or have had liver problems, including hepatitis B or C infection.
- have ever had a mental health problem.
- are pregnant or plan to become pregnant. One of the medicines in JULUCA, called dolutegravir, may harm your unborn baby.
 - Your healthcare provider may prescribe a different medicine than JULUCA if you are planning to become pregnant or if pregnancy is confirmed during the first 12 weeks of pregnancy.
 - If you can become pregnant, your healthcare provider will perform a pregnancy test before you start treatment with JULUCA, and you should consistently use effective birth control (contraception) during treatment with JULUCA.
 - Tell your healthcare provider right away if you are planning to become pregnant, you become pregnant, or think you may be pregnant during treatment with JULUCA.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. **Do not breastfeed if you take JULUCA.** You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing HIV-1 to your baby. It is not known if JULUCA can pass to your baby in your breast milk. Talk with your healthcare provider about the best way to feed your baby.

BEFORE TAKING JULUCA (cont'd)

Tell your healthcare provider about all the medicines you take:

- Keep a list that includes all prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements, and show it to your healthcare provider and pharmacist.
- Ask your healthcare provider or pharmacist about medicines that should not be taken with JULUCA.
- Do not start taking a new medicine without telling your healthcare provider.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF JULUCA

JULUCA can cause serious side effects, including:

- **Severe skin rash and allergic reactions.** Call your healthcare provider right away if you develop a rash with JULUCA. **Stop taking JULUCA and get medical help right away if you develop a rash with any of the following signs or symptoms:** fever; generally ill feeling; tiredness; muscle or joint aches; blisters or sores in mouth; blisters or peeling of the skin; redness or swelling of the eyes; swelling of the mouth, face, lips, or tongue; problems breathing.
- **Liver problems.** People with a history of hepatitis B or C virus who have certain liver function test changes may have an increased risk of developing new or worsening changes in certain liver tests during treatment with JULUCA. Liver problems, including liver failure, have also happened in people without history of liver disease or other risk factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver function. **Call your healthcare provider right away if you develop any of the following signs or symptoms of liver problems:** your skin or the white part of your eyes turns yellow (jaundice); dark or "tea-colored" urine; light-colored stools (bowel movements); nausea or vomiting; loss of appetite; pain, aching, or tenderness on the right side of your stomach area.
- **Depression or mood changes. Tell your healthcare provider right away or get medical help if you have any of the following symptoms:** feeling sad or hopeless; feeling anxious or restless; have thoughts of hurting yourself (suicide) or have tried to hurt yourself.
- **The most common side effects of JULUCA include:** diarrhea and headache.

These are not all the possible side effects of JULUCA. Tell your healthcare provider right away if you have any new symptoms while taking JULUCA. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION

- This is only a brief summary of important information about JULUCA. Talk to your healthcare provider or pharmacist to learn more.
- Go to JULUCA.com or call 1-877-844-8872, where you can also get FDA-approved labeling.



ViiV Healthcare
Research Triangle Park, NC 27709

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2019 ViiV Healthcare or licensor.
October 2019 JLC:4PIL